

Abatacept (Orencia®)

Reumatologie

U heeft in overleg met uw arts besloten het geneesmiddel Abatacept (Orencia®) te gaan gebruiken. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel.

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij uw arts.

Hoe werkt het?

Abatacept (Orencia®) is een eiwit waarmee de activiteit van T-lymfocyten wordt onderdrukt. T-lymfocyten maken deel uit van het afweersysteem. Het zijn specifieke witte bloedcellen die een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen en gewrichtsschade bij reumatoïde artritis.

Abatacept (Orencia®) blokkeert de effecten van T-lymfocyten. Daardoor wordt de gewrichtsontsteking geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Ook voelen veel patiënten zich minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Daarnaast zorgt Abatacept (Orencia®) dat beschadiging van gewrichten vertraagd wordt. Het effect is al binnen enkele weken merkbaar.

Abatacept (Orencia®) wordt gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Abatacept (Orencia®) kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende effect hebben.

Abatacept (Orencia®) wordt soms alleen gebruikt, maar ook vaak gecombineerd met het geneesmiddel methotrexaat of andere antireuma middelen. Dit omdat de combinatie effectiever is en zorgt voor minder bijwerkingen.



Figuur 1. Het geneesmiddel Abatacept (Orencia®)

Hoe wordt het gebruikt?

Abatacept (Orencia®) wordt toegediend via een infuus in de ader. Na het eerste infuus krijgt u een infuus na twee weken. Twee weken daarna krijgt u het derde infuus. Vervolgens wordt het geneesmiddel één keer in de vier weken toegediend. Soms is het nodig om een hogere dosering te gebruiken.



Figuur 2. Toediening via een infuus

De infusen worden toegediend op de afdeling Dagverpleging. Vóór de behandeling krijgt u vragen over uw gezondheid, over het effect en mogelijke bijwerkingen van eerdere Abatacept (Orencia®) infusen. Indien nodig beoordeelt de arts of er redenen zijn om het infuus niet te geven of om de dosering aan te passen.

De toediening van Abatacept (Orencia®) duurt ongeveer 30 minuten. Hierna wordt u nog een korte tijd (ongeveer 1 uur) gecontroleerd voordat u weer naar huis gaat.

Abatacept (Orencia®) werkt langzaam. Het kan soms maanden duren voordat u effect merkt.

De dosering en sterkte van Abatacept (Orencia®) wordt bepaald aan de hand van uw gewicht. Voor de start met Abatacept (Orencia®) wordt dan ook uw gewicht bepaald om de juiste dosering vast te stellen.

Bijwerkingen

Meest voorkomende bijwerkingen

- Tijdens het Abatacept (Orencia®) infuus kunnen klachten als huiduitslag, jeuk, rillingen, kortademigheid en lage bloeddruk ontstaan. Dit kan meestal worden behandeld door het infuus langzamer toe te dienen of tijdelijk te stoppen. Soms is het nodig om medicijnen te geven om de allergische reactie te behandelen of te voorkomen. Meestal zijn de klachten mild en kan de behandeling worden voortgezet.
- Milde infecties zoals verkoudheid en griep.
- Andere klachten zoals hoofdpijn, huiduitslag en maag-darm bezwaren.

Zeldzame bijwerkingen

- In zeldzame gevallen kan tijdens de behandeling tuberculose (een infectieziekte van de longen en/of andere organen met tuberkelbacillen) ontstaan. Dit betreft vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met de behandeling gekeken of er eerder besmetting met tuberculose heeft plaatsgevonden. Dit wordt gedaan met een huidtest (Mantoux reactie), blaastest en een röntgenfoto van de longen.
- In zeldzame gevallen kan er na start van de behandeling een leverontsteking ontstaan. Daarom wordt u voor het begin van de behandeling, gescreend op hepatitis B en C.
- Ernstige infecties. Mocht u klachten hebben die passen bij een ernstige infectie, zoals: hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, geef dit dan aan bij uw arts.

Gang van zaken

Voor aanvang van de behandeling met Abatacept (Orencia®) moet de uitslag van de huidtest (Mantoux), blaastest, röntgenfoto van de longen en het bloedonderzoek bekend zijn.

Daarna belt de secretaresse u op om een afspraak in te plannen voor het eerste bezoek aan de verpleegkundig reumaconsulent of verpleegkundig specialist. Of u wordt door de verpleegkundig reumaconsulent of

verpleegkundig specialist gebeld om een afspraak in te plannen voor een gesprek en uitleg over de verdere procedure. Zij proberen deze afspraak te combineren met uw afspraak bij de longarts.

De afspraak voor het infuus bij de afdeling Dagverpleging dient u zelf in te plannen. De verpleegkundig reumaconsulent of verpleegkundig specialist zorgt dat de afdeling Dagverpleging uw gegevens ontvangt.

Controlemomenten

Na de eerste zes weken heeft u een controle bij de verpleegkundig specialist. U dient drie tot vier dagen voor deze controle bloed te laten prikken, zodat de bloedsuikerspiegel tijdig beschikbaar is.

Na de eerste 12 weken vanaf de start met Abatacept (Orencia®) heeft u een controle bij uw reumatoloog. U dient weer drie tot vier dagen voor deze controle bloed te laten prikken.

Daarna vindt er één keer in de drie maanden een vervolgccontrole plaats, afwisselend bij de reumatoloog en de verpleegkundig specialist. U komt dus twee keer per jaar bij de reumatoloog, en twee keer per jaar bij de verpleegkundig specialist op vervolgccontrole. U dient weer drie tot vier dagen voor deze controles bloed te laten prikken.

Na circa één jaar Abatacept (Orencia®) te hebben gebruikt, vindt er wederom een controle van het bloed plaats. U kunt in het vervolg op de dag van de controle bloed laten prikken, dit hoeft niet meer drie tot vier dagen van te voren gedaan te worden.

Zwangerschap

Omdat de veiligheid Abatacept (Orencia®) tijdens zwangerschap en borstvoeding niet onderzocht is, raden wij u af Abatacept (Orencia®) te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding.

- Overleg met uw arts voordat u zwanger wilt worden of als u, ondanks het gebruik van voorbehoedsmiddelen, zwanger bent geworden.
- U mag geen borstvoeding geven tot zes maanden na het staken van de behandeling.

Koorts

Spuet Abatacept (Orencia®) **niet** als uw temperatuur **37,8°C of hoger** is. Bij twijfel dient u van te voren uw temperatuur te meten.

Vaccinaties

In geval van geplande vaccinatie is het van belang om vast te stellen of het vaccin dat u krijgt toegediend 'levend verzwakt' of 'dood' is. Levend verzwakte vaccins zijn **verboden** gedurende de behandeling met Abatacept (Orencia®). U dient bij vaccinatie altijd vooraf advies te vragen.

Het griepvaccin kan zonder problemen worden toegediend en wordt bij het gebruik van deze medicatie aanbevolen. Wij raden u aan om de vaccinatie 2 tot 3 dagen na of voor de behandeling met Abatacept (Orencia®) te spuiten.

Operaties

Het gebruik van Abatacept (Orencia®) moet 2 maanden voor een geplande ingreep gestopt worden. Overleg dit op tijd met uw Reumatoloog.

Tenslotte

- Uw huisarts wordt middels een brief geïnformeerd over u behandeling.
- Na de eerste drie behandelingen met Abatacept (Orencia®) mag u niet zelfstandig naar huis. Zorg voor begeleiding.
- Als u de dag voor de infuustoediening koorts heeft, moet u de afdeling Dagverpleging bellen om de afspraak af te zeggen.
- Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Reumatologie. De contactgegevens staan vermeld op de achterzijde van deze folder.

Reumatologie

Meldpunt West 06

Afsprakennummer 088 - 459 7924

Informatienummer 088 - 459 7838

Reumatologen:

Drs. H. van der Tempel

Dr. R.H.M. Peeters

Dr. M.J.F. Starmans-Kool

Dr. M.C.G.S. Jacobs

Drs. H. Hulsmans

Reumaconsulente/Nurse Practitioner

Reumaconsulente

Mevr. J. Broeren

E-mail: j.broeren@orbisconcern.nl

Nurse Practitioner/Verpleegkundig specialist

Dhr. W.J.Bougie

E-mail: w.bougie@orbisconcern.nl

Afsprakennummer 088 - 459 7924

Informatienummer 088 - 459 7838

Dagverpleging

Meldpunt Oost 31

Telefoon 088 – 459 3800

Maandag t/m vrijdag van 7.30 – 20.00 uur

Internet

www.orbismedischcentrum.nl