

# Blaasspoeling met BCG-oplossing

## Inleiding

Bij u is onlangs kwaadaardig weefsel, ook wel een tumor genoemd, uit de blaas verwijderd. Zoals uw uroloog met u besproken heeft, wordt u verder behandeld met blaasspoelingen met Bacil Calmet Guerin (BCG).

Dit is een oplossing met een sterk verzwakte stam van een tuberculosebacterie. Deze bacterie veroorzaakt een tijdelijke en kortdurende ontsteking in de blaas die vanzelf overgaat. Bewezen is, dat de behandeling met BCG- spoelingen effectief is, niet alleen bij de behandeling, maar ook ter voorkoming van oppervlakkige tumoren in de blaas.

In eerste instantie duurt de behandeling zes weken en krijgt u één keer per week een blaasspoeling met de BCG-oplossing. Daarna bespreekt de specialist met u het verdere verloop van de behandeling. Elke keer voordat u de spoeling krijgt, heeft u een gesprek met de uroloog. Daarna wordt pas besloten of u de spoeling mag krijgen.

## Vóór de behandeling

Het is van groot belang om de productie van urine tijdens de blaasspoeling zo laag mogelijk te houden. Dit is noodzakelijk om de oplossing zo min mogelijk te verdunnen en om ervoor te zorgen dat u de vloeistof één tot twee uur op kunt houden.

U mag dan ook bij voorkeur **vier uur** vóór de behandeling en tijdens de behandeling niet drinken.

## De behandeling

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Urologie.
- U krijgt vooraf altijd een gesprek met de specialist. Deze beslist of u de blaasspoeling mag krijgen. Bij gebruik van antibiotica moet de blaasspoeling worden uitgesteld. Ook als er bloed in de urine wordt aangetroffen of als blijkt dat u een blaasinfectie heeft, moet de spoeling worden uitgesteld.
- U dient voordat u de spoeling krijgt wat urine op te vangen voor onderzoek. Dit kan ook via de blaaskatheter opgevangen worden.
- Via de plasbuis wordt een blaaskatheter in de blaas gebracht. Via de katheter loopt de urine die zich eventueel nog in de blaas bevindt eruit. Daarna wordt via deze katheter 50 ml BCG-oplossing in uw blaas gebracht, waarna de katheter weer verwijderd wordt.
- De BCG-oplossing moet **twee uur** in de blaas blijven. Het effect is dan het grootst.
- Nadat de spoeling ingebracht is, mag u de polikliniek verlaten.

## Na de behandeling

Na **twee uur** kunt u naar het toilet (thuis) om te plassen om zo de oplossing uit de blaas te verwijderen.

De BCG-oplossing bevat een verzwakte, levende tuberculosebacil. Deze bacil kan andere infecties veroorzaken, bijvoorbeeld luchtweginfecties. Het is dan ook belangrijk om u gedurende de eerste 48 uur te houden aan de volgende regels om uzelf en anderen te beschermen tegen mogelijke infecties.

- U dient **zittend** te plassen, dit om spetteren te voorkomen.
- Als u de wc doorspoelt, sluit dan bij voorkeur de wc-bril.
- Na gebruik van het toilet, was uw handen goed met water en zeep.
- Voor de reiniging van het toilet en de toiletbril, gebruik bleekwater. Het beste is om het bleekwater vijftien minuten te laten inwerken en vervolgens door te spoelen.
- Het is beter om de dag van de spoeling en de week erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.
- Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.

## Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen met een BCG-oplossing zonder problemen. Soms kunnen toch bijwerkingen optreden, die in het algemeen mild en van voorbijgaande aard zijn.

De bijwerkingen waarvan u last kunt krijgen zijn:

- vaker plassen en bij het plassen een branderig gevoel. Dit verdwijnt meestal binnen twee dagen;
- er kan een 'griepgevoel' met lichte tot matige temperatuurstijging voorkomen. Dit begint meestal binnen vier uur na de spoeling en duurt één tot twee dagen;
- gewrichtsklachten, zwelling van de lymfeklieren, longontsteking en tijdelijke leverfunctiestoornissen. Deze bijwerkingen treden zelden op.

## Uw arts waarschuwen

In de volgende gevallen neemt u contact op met de (dienstdoende) uroloog:

- bij koorts boven de 39 °C;
- bij koorts boven de 38 °C die langer dan 48 uur aanhoudt;
- bij verschijnselen van een longontsteking;
- bij verschijnselen van een gewrichtsontsteking;
- bij verschijnselen van een ontsteking aan de (bij) bal.

**Vermeld altijd dat u bezig bent met een behandeling met BCG-spoelingen.**

### **Controle**

Om het effect van de spoelingen te controleren, wordt regelmatig in de blaas gekeken (cystoscopie).

### **Meer informatie**

Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp, vraag vervolgens naar de dienstdoende uroloog.

De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze brochure.

**Zuyderland Medisch Centrum Heerlen**

**Polikliniek Urologie**

Etage 1, balie 10

Telefoon 045 - 576 64 20

**Spoedeisende Hulp**

Telefoon 045 - 576 72 00

*Buiten kantooruren. Vraag naar de dienstdoende uroloog*

[www.zuyderland.nl](http://www.zuyderland.nl)