

# Gewrichtsverdoving

Marcaïnisatie

## **Gewrichtsverdoving (Marcaïnisatie)**

Binnenkort wordt bij u een lokale gewrichtsverdoving (marcaïnisatie) verricht. Tijdens dit onderzoek krijgt u een injectie met Marcaïne (plaatselijk verdovend geneesmiddel) in het gewricht. Deze stof heeft geen bijwerkingen die schadelijk zijn voor het gewricht. Door de injectie wordt het gewricht tijdelijk gevoelloos gemaakt. Hierdoor wordt het mogelijk om pijnlijke aandoeningen van het geïnjecteerde gewricht te onderscheiden van andere aandoeningen die in de buurt van dit gewricht voor soortgelijke klachten kunnen zorgen.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 30 minuten voor het afgesproken tijdstip bij de afdeling Dagverpleging.

### **Vorbereiding**

U hoeft voor het onderzoek geen voorbereidingen te treffen.

### **Het onderzoek**

Voordat het onderzoek begint, neemt u plaats op de onderzoekstafel. Deze speciale tafel heeft een röntgeninstallatie. Op deze manier kan tijdens het prikken de positie van de injectienaald worden gevolgd.

De arts desinfecteert de huid en brengt onder röntgendoorlichting de injectienaald in het gewricht. Om er zeker van te zijn dat de injectienaald het gewricht heeft bereikt, wordt door de arts een kleine hoeveelheid contrastmiddel in het gewricht gespoten. Daarna wordt via dezelfde naald het gewricht ingespoten met Marcaïne. Het totale onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. De verdoving werkt na ongeveer twintig minuten en de werking houdt doorgaans acht tot twaalf uren aan.

### **Na het onderzoek**

Het is toegestaan het geïnjecteerde gewricht te gebruiken. Ook bij een injectie in het heupgewricht kunt u uw been normaal te belasten. In het kader van veiligheid en controle verblijft u nog enige tijd op de Dagverpleging (+/- 3 uur). Hierna mag u naar huis gaan. U mag zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

*Houd er rekening mee dat er een kortdurende krachtsvermindering kan optreden!*

### **Uitslag**

Doorgaans vindt de poliklinische controle ongeveer zes tot acht weken na de injectie plaats. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.

Het is van belang dat u bij poliklinische controle de behandelend arts kunt vertellen wat het effect van de injectie op uw klachten is geweest.

Schrijf daarom de eerste weken op hoe u klachten veranderen en vertel dit aan uw arts bij de controle afspraak.

## Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met Orthopedie. Het telefoonnummer vindt u op de achterpagina.

**Contact**

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord.

**Orthopedie****Zuyderland Medisch Centrum****Afspraken polikliniek**

088 - 459 9708

**Openingstijden polikliniek**

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

**Bezoekadres polikliniek**

Locatie Heerlen, souterrain balie 25

Locatie Sittard-Geleen, Oost 11

**Internetadressen**

[www.zuyderland.nl/orthopedie](http://www.zuyderland.nl/orthopedie)