

Cystoscopie met coagulatie

Verwijderen blaaspoliepen

Er wordt binnenkort bij u een cystoscopie met coagulatie verricht. Hiermee worden blaaspoliepen verwijderd. In deze brochure leest u stap voor stap wat deze behandeling inhoudt.

Dag van de behandeling

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Urologie. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.

Vorbereiding

Een verpleegkundige brengt u naar een onderzoekskamer. Er wordt bij u een blaaskatheter ingebracht en uw blaas wordt leeggemaakt. Vervolgens wordt er een verdovende vloeistof via de blaaskatheter in de blaas ingebracht.

U neemt ongeveer 15 minuten plaats in de wachtkamer zodat de verdoving de tijd krijgt om in te werken. Het is belangrijk dat u tijdens het wachten **NIET** gaat plassen. De verdoving werkt dan onvoldoende.

U hoeft niet bang te zijn dat de urine zomaar wegloopt ten gevolge van de verdoving. Uitsluitend de binnenkant van de blaas wordt verdoofd en dit heeft verder géén invloed op de sluitspier van de blaas.

Behandeling

Deze behandeling gebeurt poliklinisch en wordt uitgevoerd door een uroloog of een uroloog in opleiding. Het duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Cystoscopie

De behandeling wordt verricht met behulp van een cysto-scoop. Dit is een dunne holle buis met verlichting en een lens aan het uiteinde. Deze buis wordt via de plasbuis in de blaas gebracht. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beiden kunnen zowel bij mannen als bij vrouwen gebruikt worden. Als deze buis is ingebracht wordt via deze buis een dunne draad ingebracht waarmee de blaaspoliepen verwijderd worden.

Stap voor stap

- U wordt naar de behandelkamer gebracht. Hier doet u uw onderbroek en rok of lange broek uit.
- U neemt plaats op de behandeltafel en legt u uw benen in de beensteunen.
- De omgeving van de plasbuis wordt gereinigd en gedesinfecteerd.

- Er wordt een soort gelei in de plasbuis gespoten. Deze dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel voor de plasbuis. Het inbrengen van de cystoscoop gaat gemakkelijker en de kans op pijn wordt tot een minimum beperkt.
- U krijgt een pleister voorzien van gelei op uw bovenbeen of onderbuik geplakt.
- Als de cystoscoop is ingebracht, wordt er steriel water in de blaas gebracht. U kunt hierdoor aandrang krijgen om te plassen. Dit gebeurt pas als de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken.
- Vervolgens brengt de uroloog een dunne draad in. Hiermee stipt hij de blaaspoliepen aan waardoor deze verwijderd worden. Tijdens het aanstippen hoort u een doordringende “piep”. Het aanstippen is niet pijnlijk. Is dit wel het geval, geeft dit dan aan.
- Als alle blaaspoliepen verwijderd zijn is de behandeling afgelopen en mag u uitplassen. Hierna kunt u naar huis.

Na de behandeling

- U kunt last hebben van een branderig gevoel bij het plassen. Dit kan nog enkele dagen het geval zijn.
- Ook kunt u meer aandrang voelen om te plassen en kan er wat bloed en/of kleine stukjes weefsel in de urine zitten. Dit kan geen kwaad.

Het is belangrijk dat u na de behandeling veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer contact opnemen

- Bij koorts boven de 38.5 °C;
- Bij pijn die, na het inname van pijnstillers, niet verdwijnt;
- Als u meerdere dagen bloed in de urine blijft houden en waarbij de urine donkerrood van kleur is;
- Als u behalve bloed, ook flinke bloedstolsels met de urine uitplast;
- Als u zoveel moeite heeft met plassen dat u het gevoel heeft de blaas niet helemaal leeg te plassen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Verhinderd?

Neem zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Internet

www.zuyderland.nl

Zuyderland Medisch Centrum

Polikliniek Urologie

Etage 1, balie 10

Telefoon 088 - 459 9704

Spoedeisende Hulp

Telefoon 088 – 459 2800

Buiten kantooruren. Vraag naar de dienstdoende uroloog