

# Bronchoscopie

Longgeneeskunde

Binnenkort vindt bij u een onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie) plaats. In deze folder leggen wij u uit wat het onderzoek inhoudt. Daarnaast geven wij u informatie over de gang van zaken op de dag van het onderzoek.

**Doel van het onderzoek**

Het doel van het onderzoek is een goed inzicht te krijgen in de structuur van het slijmvlies in uw luchtwegen en om eventueel de aanwezigheid van ontstekingen en/of afwijkingen vast te stellen.

Via de bronchoscoop kan weefsel of slijm worden weggenomen voor het maken van een kweek of microscopisch onderzoek.

## **Het onderzoek**

Bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met behulp van een bronchoscoop uw luchtwegen bekijkt. Een bronchoscoop is een flexibele slang met aan het uiteinde een heel kleine camera met lampje.

## **De voorbereiding op het onderzoek**

### *Nuchter*

Vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek mag u niks meer eten en vanaf 24.00 uur niks meer drinken. De ochtend van het onderzoek is alleen het drinken van een klein slokje water toegestaan.

U mag 's morgens wel gerust uw tanden poetsen.

Hebt u echter pas 's middags een afspraak, dan is het toegestaan om omstreeks 08.00 uur 's morgens een licht ontbijt te gebruiken (2 beschuiten met jam en een kopje thee). Daarna mag u niet meer eten en drinken tot na het onderzoek.

### *Medicatie*

Anderhalf uur voor het onderzoek mag u de voorgeschreven medicatie innemen (Codeïne en Seresta oftewel Oxazepam). Deze medicatie zorgt ervoor dat u wat meer ontspannen bent en dat u wat minder last heeft van de hoestreflex.

Om ervoor te zorgen dat de kans op bloedingen verkleind wordt is het van belang dat u het gebruik van bloedverdunners, **in overleg met uw longarts**, een aantal dagen vóór het onderzoek stopt. In onderstaande opsomming kunt u per soort bloedverdunner opzoeken hoeveel dagen.

- Als u de bloedverdunner **Sintrom**<sup>®</sup> (acenocoumarol) slikt dient u hiermee **drie dagen voor het onderzoek** te stoppen.
- Als u de bloedverdunner **Marcoumar**<sup>®</sup> slikt dient u hiermee **vijf dagen voor het onderzoek** te stoppen.
- Als u de bloedverdunner **Plavix**<sup>®</sup> slikt dient u hiermee **zeven dagen voor het onderzoek** te stoppen.

Alleen in overleg met uw longarts moet u stoppen met Ascal® (acetylsalicylzuur), Persantin®, Asasantin® en Dipyridamol®.

## **Het onderzoek**

De longarts verricht het onderzoek in de onderzoekkamer, geassisteerd door een endoscopieverpleegkundige.

Om de hoestreflex te onderdrukken wordt voorafgaand aan het onderzoek uw keel goed verdoofd met een bitter smakende spray. Als de keel geheel verdoofd is zal de dokter nog de stembanden verdoven. Vervolgens kunt u op uw rug op de onderzoektafel gaan liggen. Tijdens het onderzoek wordt uw zuurstofgehalte in de gaten gehouden door middel van een knijper op uw vinger en krijgt u wat zuurstof toegediend.

De arts zal de bronchoscoop via uw mond of neus inbrengen. Probeer u zich tijdens het onderzoek zo goed mogelijk te ontspannen. Tijdens het onderzoek worden uw luchtwegen niet afgesloten en blijft er genoeg ruimte over zodat u rustig kunt doorademen.

## **De gang van zaken**

Op het afgesproken tijdstip dient u zich te melden bij de Endoscopieafdeling. Als u bent opgenomen op een verpleegafdeling of via dagverpleging geholpen wordt, dan wordt u op een afgesproken tijdstip naar de Endoscopieafdeling gebracht.

## **Na het onderzoek**

- Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling / dagverpleging.
- Als u poliklinisch bent onderzocht oftewel direct na het onderzoek naar huis mag, dient u onder begeleiding naar huis te gaan. U mag niet zelf autorijden vanwege de toegediende medicatie.
- De keelverdooving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. U kunt dan weer normaal eten en drinken.
- Het is mogelijk dat u wat bloederig speeksel moet opgeven of moeite hebt met slikken. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken.

## **De tijdsduur van het onderzoek**

Het onderzoek zelf duurt gemiddeld 20 minuten.

## **De uitslag van het onderzoek**

De longarts zal meteen na het onderzoek zijn bevindingen met u bespreken. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is gemiddeld na een week beschikbaar.

## Tenslotte

- Als u diabetespatiënt bent, verzoeken wij u dit tijdig door te geven. In overleg met de specialist wordt bekeken in hoeverre u nuchter moet zijn.
- Als u op het moment van het onderzoek zwanger bent of het vermoeden hebt dit te zijn, vragen wij u dit van te voren te melden. De arts kan hiermee dan rekening houden.
- Als u nog vragen hebt, stelt u ze gerust. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de Endoscopieafdeling.
- Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de achterkant van deze folder.

## Geef uw mening!

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op [www.ZorgkaartNederland.nl](http://www.ZorgkaartNederland.nl), een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

**Zuyderland Medisch Centrum  
Endoscopieafdeling**

**Telefonische bereikbaarheid**

088 – 459 9715

Locatie Sittard-Geleen, kies optie 1

Locatie Heerlen, kies optie 2

**Openingstijden**

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

**Bezoekadres**

Locatie Sittard-Geleen, Meldpunt Oost 35

Locatie Heerlen, Vleugel B, begane grond

**SPOED**

Hebt u vragen of complicaties na het onderzoek, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur bellen met 088 – 459 9715. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende internist via de Spoedeisende hulp. (Heerlen: 088 – 459 2800 / Sittard-Geleen: 088 – 459 7876)

**Internet**

[www.zuyderland.nl/endoscopieafdeling](http://www.zuyderland.nl/endoscopieafdeling)

[www.zuyderland.nl](http://www.zuyderland.nl)