

BLOEDTRANSFUSIE

4-5-6 transfusietrigger



4

Bloedtransfusie overwogen bij

Hb < 4 mmol/l

- Chronische asymptomatische anemie
- Acut bloedverlies: < 60 jaar, ASA 1, normovolemisch en 1 bloedingslocus

5

Hb < 5 mmol/l

- Acut bloedverlies:
 - > 60 jaar, ASA 1, normovolemisch en 1 bloedingslocus
 - < 60 jaar, normovolemisch en meerdere bloedingsloci
- Preoperatief < 60 jaar bij een te verwachten bloedverlies > 500 ml
- Koorts
- ASA 2 en 3, ongecompliceerd

6

Hb < 6 mmol/l

- ASA 4
- Ernstig longlijden
- Geen compensatie/ toename cardiac output mogelijk
- Septisch en toxisch
- Symptomatische cerebrovasculaire ziekte
- Instabiele angina pectoris of acut myocardinfarct

X

GEEN transfusie voor

- Verbetering algehele conditie
- Verbetering wondgenezing
- Profylaxe
- Volume expansie

Doseer per eenheid!

Eén eenheid leidt tot een Hb stijging van ca. 0.6 mmol/l bij een patiënt van 70 kg.

ASA classificatie

1. Gezonde patiënt
2. Lichte systemische afwijking, zonder functiebeperking
3. Ernstige functiebeperkende systemische afwijking
4. Systemische afwijking met constant levensgevaar

Protocollen bloedtransfusie:

Kwaliteitsportaal – Bloedtransfusie

